

Sida y Leucemia Felina



catvet®



Sida y Leucemia Felina



El virus de **inmunodeficiencia felina (FIV)** / **Sida** y el virus de **leucemia felina (FeLV)** son altamente contagiosos entre gatos, pero no afectan a humanos ni otros animales. Estos virus pueden llegar a ser mortales.

Virus de Inmunodeficiencia Felina (FIV):

- Más común en **gatos machos** no castrados que pelean con otros.
- Se **transmite a través de la saliva**, generalmente por **heridas de mordedura**.
- Un gato positivo a Sida puede vivir muchos años, hasta su vejez ya que es una enfermedad que podría tener un curso lento.
- En Latinoamérica, hasta **25%** de los gatos testeados están infectados.




Virus de Leucemia Felina (FeLV):

- Se propaga comúnmente entre gatos que viven juntos, también de madre a hijos.
- El **contacto es directo** a través de la **saliva al acicalarse**, y al compartir tazones de comida y agua.
- En gatos menores de un año puede desarrollarse de forma aguda y generar anemias severas y tumores, llegando al fallecimiento del gatito en menos de 3 años de edad.
- En **Latinoamérica, hasta 42%** de los gatos testeados están infectados.

Gatos infectados con FIV o FeLV pueden mostrar:

- Enfermedad leve al principio (fiebre, pérdida de apetito) que desaparece rápidamente.
- Período de aparente salud que puede durar meses o años en el caso del Sida.
- Riesgo de reactivación de la infección y debilidad del sistema inmunológico.
- Posibilidad de desarrollar **tumores o anemia**.
- Algunos gatos **pueden eliminar el virus o controlar la infección**.
- Problemas graves y potencialmente fatales si la infección se activa.

Es importante mencionar que muchos gatos infectados con SIDA **pueden vivir vidas largas y saludables**.



Diagnóstico:

Se pueden realizar **pruebas para detectar FIV y FeLV** en tu gato.

Se recomienda testear cuando:

- El gato está enfermo o tiene enfermedades asociadas a el sistema inmune.
- Si el gato sale al aire libre o pelea con otros gatos.
- Cuando se adopta un nuevo gato o se introduce uno nuevo en el hogar.
- Si el resultado es positivo, el veterinario puede recomendar pruebas adicionales.
- Incluso si el resultado inicial es negativo, el veterinario puede recomendar pruebas de seguimiento en el futuro.



Prevención:

- No hay vacunas contra FIV/ Sida.
- Vacunas contra FeLV (Leucemia) están disponibles y se recomiendan para todos los gatitos.
 1. Repetir al año siguiente.
 2. Gatos que salen al aire libre.
 3. Gatos adultos que viven en interiores y solos o con gatos no infectados pueden no necesitar vacunarse después de los 2 primeros años.
- Tu veterinario evaluará las necesidades de vacunación de tu gato.




Manejo de gatos infectados:

- No hay cura, solo manejo.
- Visita regular al veterinario, controles médicos.
- Alimentación de alta calidad.
- Mantén en interiores.
- Evita estrés.
- Tu veterinario es tu socio en el cuidado.

Con atención regular y una vida baja en estrés, los gatos infectados pueden vivir felices y saludables durante muchos años.

RECUERDA QUE ...

Tú eres un miembro importante del equipo de salud de tu gato. Juegas un papel crucial en el éxito de los tratamientos y en la mejora de la atención médica de tu gato.



Síguenos



CATVET.PE



996 871 312



WWW.CATVET.PE



catvet®

